

PARASITOLOGICO Y T. GRAHAM

PARASITOLOGICO SERIADO

- Tres días antes:

- Disminuir la ingesta de verduras de hoja, frutas con hollejo, manteca o grasa.
- No tomar anti-diarréicos, antiácidos, antibióticos, o sustancias de contraste radiológico.
- Comprar recipiente COPROKIT en la farmacia.
- Recolectar materia fecal (sin orinar) sobre una hoja de plástico o bacinilla o pelela.
- Tomar una pequeña porción (del tamaño de 1/2 cucharita de café), colocar en el recipiente y mezclar con el conservante que contiene.
- Recolectar de 3 a 5 muestras en días alternados (no consecutivos), en un término de hasta 10 días.
- Tapar bien el recipiente.
- El recipiente, contiene un conservante que es toxico si se lo ingiere, mantenga fuera del alcance de los niños.

TEST DE GRAHAM

MATERIALES: - Recipiente descartable para orina

- Gasas esteriles

INSTRUCCIONES:

- Por la mañana al despertar, aún en la cama, frotar una de las gasas entregadas por la zona anal y perianal.
 - Colocarla dentro del recipiente de orina descartable que contenga 2 cm de agua corriente y tapar bien.
 - Repetir la recolección durante 7 días consecutivos.
 - Se entregan 7 gasas, una para cada mañana.
 - Remitir al laboratorio una vez completada la recolección.
- Por favor, cumpla con estas instrucciones.